

**Docteur Alain AZUELOS**  
**Chirurgien – Dentiste**

—  
Diplômé de la Faculté de Médecine  
de Strasbourg

—  
Ancien Assistant des Universités

—  
Attaché chargé d'Enseignement

—  
Certificats d'Etudes Supérieures en :

- Biologie de la bouche
- Prothèse scellée
- Prothèse adjointe partielle
- Prothèse adjointe complète

—  
Consultation sur rendez- vous



**Conduite à tenir après ...**  
**LA POSE D'UNE PROTHESE AMOVIBLE !**

- o Une prothèse amovible **paraît toujours très encombrante** les premiers jours.
- o Il faut un **certain temps** à la langue et aux joues **pour s'habituer à ce nouveau volume**.
- o Un bon exercice consiste à **lire à haute voix** pour s'habituer à ce nouveau contact.
- o Il est **normal de saliver davantage** pendant quelques jours.
- o Pour manger, au moins pendant huit jours, **évités les aliments trop durs, prenez de petits morceaux et mastiquez lentement**. Il est important de s'habituer progressivement.
- o Une **prothèse neuve peut blesser**. Il faut **la porter au moins 24 heures avant votre rendez-vous** pour que le praticien puisse localiser exactement l'emplacement de la blessure et **effectuer une rectification précise**.
- o Il est important de **demandez conseil à son praticien en ce qui concerne le port de la prothèse la nuit**. Lorsque la prothèse n'est pas portée, elle doit être conservée dans l'eau additionnée d'un désinfectant, après avoir été nettoyée.
- o **Nettoyer** régulièrement votre prothèse, **après chaque repas, à l'aide d'une brosse appropriée et du savon** (ni brosse à dent, ni dentifrice)
- o Placez-vous **pour la nettoyer au dessus d'un lavabo rempli d'eau**. Ainsi, si elle vous échappe des mains, l'eau amortira le choc ce qui peut éviter une fracture de la prothèse.
- o **Brossez parfaitement vos dents naturelles sur toutes leurs faces ainsi que la gencive** (brosse à dent et dentifrice).
- o **Ne jamais tenir une prothèse du bas par les deux côtés à la fois**, vous risqueriez de la briser.